



SECRETARÍA ACADÉMICA, DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

DIRECCIÓN DE DOCENCIA E INNOVACIÓN EDUCATIVA


FORMULARIO CIENCIAS BÁSICAS

EVENTO NACIONAL ESTUDIANTIL DE CIENCIAS (ENEGB)




MATEMÁTICAS

Geometría




$$\text{Volumen} = \frac{4}{3} \pi r^3$$

$$\text{Área de la Superficie} = 4 \pi r^2$$



$$\text{Volumen} = \pi r^2 h$$


$$\text{Área de la superficie lateral} = 2 \pi r h$$



$$\text{Volumen} = \frac{1}{3} \pi r^2 h$$


$$\text{Área de la superficie lateral}$$

$$= \pi r \sqrt{r^2 + h^2} = \pi r l$$



$$\text{Volumen} = \frac{1}{3} \pi a b h$$

$$\text{Área de la superficie lateral}$$



$$\text{Volumen} = \frac{1}{3} \pi h (a^2 + a b + b^2)$$

$$\text{Área de la superficie lateral}$$

$$= \pi (a + b) \sqrt{h^2 + (b - a)^2}$$


$$= \pi (a + b) l$$

Trigonometría

$\sin^2 A + \cos^2 A = 1$	$\sin^2 A = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \cos 2A$
$\sec^2 A - \tan^2 A = 1$	$\cos^2 A = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cos 2A$
$\csc^2 A - \cot^2 A = 1$	$\sin 2A = 2 \sin A \cos A$
$\sin A \csc A = 1$	$\cos 2A = \cos^2 A - \sin^2 A$
$\cos A \sec A = 1$	$\sin(A \pm B) = \sin A \cos B \pm \cos A \sin B$
$\tan A \cot A = 1$	$\cos(A \pm B) = \cos A \cos B \mp \sin A \sin B$
$\sin(-A) = -\sin A$	$\tan(A \pm B) = \frac{\tan(A) \pm \tan(B)}{1 \mp \tan(A) \tan(B)}$
$\cos(-A) = \cos A$	$\sin \frac{A}{2} = \pm \sqrt{\frac{1 - \cos A}{2}}$
$\tan(-A) = -\tan A$	$\cos \frac{A}{2} = \pm \sqrt{\frac{1 + \cos A}{2}}$
$\sin A \cos B = \frac{1}{2} [\sin(A - B) + \sin(A + B)]$	$\sin A \sin B = \frac{1}{2} [\cos(A - B) - \cos(A + B)]$
	$\cos A \cos B = \frac{1}{2} [\cos(A - B) + \cos(A + B)]$

Sea el siguiente triángulo plano $f * g = \int_0^t f(\tau)g(t - \tau)d\tau$ de lados $= I_0 =$

$\int \int_R (x^2 + y^2)\rho(x, y)dA$ y ángulos $f(x) = \sum_{-\infty}^{\infty} C_n e^{\frac{inx}{L}}$.



Ley de los senos	$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C}$	
Ley de los cosenos	$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C$	Los otros lados y ángulos están relacionados en forma similar
Ley de las tangentes	$\frac{a+b}{a-b} = \frac{\tan \frac{1}{2}(A+B)}{\tan \frac{1}{2}(A-B)}$	Los otros lados y ángulos están relacionados en forma similar

Números complejos

Teorema de DeMoivre	$[r(\cos \theta + i \sin \theta)]^n = r^n(\cos n\theta + i \sin n\theta)$	n : número entero
Raíces de números complejos	$[r(\cos \theta + i \sin \theta)]^{\frac{1}{n}}$ $= r^{\frac{1}{n}} \left[\cos \left(\frac{\theta + 2k\pi}{n} \right) + i \sin \left(\frac{\theta + 2k\pi}{n} \right) \right]$	n : número entero positivo $k = 0, 1, 2, \dots, n - 1$

Geometría analítica del espacio

Considerando $P_1(x_1, y_1, z_1)$ y $P_2(x_2, y_2, z_2)$:

Vector que une P_1 y P_2	$\underline{P_1P_2} = \langle (x_2 - x_1), (y_2 - y_1), (z_2 - z_1) \rangle = \langle l, m, n \rangle$
Distancia entre dos puntos	$d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2} = \sqrt{l^2 + m^2 + n^2}$
Recta que pasa por dos puntos	Forma paramétrica $x = x_1 + lt \quad y = y_1 + mt \quad z = z_1 + nt$
	Forma simétrica $t = \frac{x - x_1}{l} \quad t = \frac{y - y_1}{m} \quad t = \frac{z - z_1}{n}$
Cosenos Directores	$\cos \alpha = \frac{x_2 - x_1}{d} = \frac{l}{d} \quad \cos \beta = \frac{y_2 - y_1}{d} = \frac{m}{d} \quad \cos \gamma = \frac{z_2 - z_1}{d} = \frac{n}{d}$
	donde α, β, γ ángulos que forman la línea que une los puntos P_1 y P_2 con la parte positiva de los ejes x, y, z , respectivamente
	$\alpha + \beta + \gamma = 1 \quad l^2 + m^2 + n^2 = 1$
Ecuación del Plano	Que pasa por un punto $P_1(x_1, y_1, z_1)$ y tiene vector normal $\vec{n} = \langle n_1, n_2, n_3 \rangle$ $n_1(x - x_1) + n_2(y - y_1) + n_3(z - z_1) = 0$
	Forma general $Ax + By + Cz + D = 0$
	Distancia del punto $P_0(x_0, y_0, z_0)$ al plano $Ax + By + Cz + D = 0$ $d = \frac{ Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D }{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$
	Ángulo entre dos rectas en el plano $\tan \alpha = \frac{m_2 - m_1}{1 + m_1 m_2}$

Coordenadas

<p>Cilíndricas (r, θ, z)</p> $\begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \\ z = z \end{cases} \quad \text{o} \quad \begin{cases} r = \sqrt{x^2 + y^2} \\ \theta = \tan^{-1}\left(\frac{y}{x}\right) \\ z = z \end{cases}$	
--	--

<p>Esféricas (r, θ, ϕ)</p> $\begin{cases} x = r \sin \theta \cos \phi \\ y = r \sin \theta \sin \phi \\ z = r \cos \theta \end{cases} \quad \text{o} \quad \begin{cases} r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \\ \phi = \left(\frac{y}{x}\right) \text{ con } x \neq 0 \\ \theta = \left(\frac{z}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}\right) \end{cases}$	
---	--

Reglas generales de derivación

$$\frac{d}{dx}(c) = 0$$

$$\frac{d}{dx}(cx) = c$$

$$\frac{d}{dx}(cx^n) = ncx^{n-1}$$

$$\frac{d}{dx}(u \pm v) = \frac{du}{dx} \pm \frac{dv}{dx}$$

$$\frac{d}{dx}(cu) = c \frac{du}{dx}$$

$$\frac{d}{dx}(uv) = u \frac{dv}{dx} + v \frac{du}{dx}$$

$$\frac{d}{dx}(uvw) = uv \frac{dw}{dx} + uw \frac{dv}{dx} + vw \frac{du}{dx}$$

$$\frac{d}{dx}\left(\frac{u}{v}\right) = \frac{v\left(\frac{du}{dx}\right) - u\left(\frac{dv}{dx}\right)}{v^2}$$

$$\frac{d}{dx}(u^n) = nu^{n-1} \frac{du}{dx}$$

$$\frac{dF}{dx} = \frac{dF}{du} \frac{du}{dx} \quad \text{(Regla de la cadena)}$$

$$\frac{du}{dx} = \frac{1}{\frac{dx}{du}}$$

$$\frac{dF}{dx} = \frac{\frac{dF}{du}}{\frac{dx}{du}}$$

Derivadas de las funciones exponenciales y logarítmicas

$$\frac{d}{dx} \log_a u = \frac{\log_a e}{u} \frac{du}{dx} \quad a > 0, \quad a \neq 1$$

$$\frac{d}{dx} \ln u = \frac{d}{dx} \log_e u = \frac{1}{u} \frac{du}{dx}$$

$$\frac{d}{dx} a^u = a^u \ln a \frac{du}{dx}$$

$$\frac{d}{dx} e^u = e^u \frac{du}{dx}$$

$$\frac{d}{dx} u^v = \frac{d}{dx} e^{v \ln u} = e^{v \ln u} \frac{d}{dx} [v \ln u] = v u^{v-1} \frac{du}{dx} + u^v \ln u \frac{dv}{dx}$$

Derivadas de las funciones trigonométricas y de las trigonométricas inversas

$$\frac{d}{dx} \operatorname{sen} u = \operatorname{cos} u \frac{du}{dx}$$

$$\frac{d}{dx} \operatorname{cos} u = -\operatorname{sen} u \frac{du}{dx}$$

$$\frac{d}{dx} \operatorname{tan} u = \operatorname{sec}^2 u \frac{du}{dx}$$

$$\frac{d}{dx} \operatorname{cot} u = -\operatorname{csc}^2 u \frac{du}{dx}$$

$$\frac{d}{dx} \operatorname{sec} u = \operatorname{sec} u \operatorname{tan} u \frac{du}{dx}$$

$$\frac{d}{dx} \operatorname{csc} u = -\operatorname{csc} u \operatorname{cot} u \frac{du}{dx}$$

$$\frac{d}{dx} \operatorname{sen}^{-1} u = \frac{1}{\sqrt{1-u^2}} \frac{du}{dx} \quad \left[-\frac{\pi}{2} < \operatorname{sen}^{-1} u < \frac{\pi}{2} \right]$$

$$\frac{d}{dx} \operatorname{cos}^{-1} u = \frac{-1}{\sqrt{1-u^2}} \frac{du}{dx} \quad [0 < \operatorname{cos}^{-1} u < \pi]$$

$$\frac{d}{dx} \operatorname{tan}^{-1} u = \frac{1}{1+u^2} \frac{du}{dx} \quad \left[-\frac{\pi}{2} < \operatorname{tan}^{-1} u < \frac{\pi}{2} \right]$$

$$\frac{d}{dx} \operatorname{cot}^{-1} u = \frac{-1}{1+u^2} \frac{du}{dx} \quad [0 < \operatorname{cot}^{-1} u < \pi]$$

$$\frac{d}{dx} \operatorname{sec}^{-1} u = \frac{1}{|u| \sqrt{u^2-1}} \frac{du}{dx} = \frac{\pm 1}{u \sqrt{u^2-1}} \frac{du}{dx}$$

$$\left[\begin{array}{l} + \text{ si } 0 < \operatorname{sec}^{-1} u < \frac{\pi}{2} \\ - \text{ si } \frac{\pi}{2} < \operatorname{sec}^{-1} u < \pi \end{array} \right]$$

$$\frac{d}{dx} u = \frac{-1}{|u| \sqrt{u^2-1}} \frac{du}{dx} = \frac{\mp 1}{u \sqrt{u^2-1}} \frac{du}{dx}$$

$$[- \text{ si } 0 < u < \frac{\pi}{2} + \text{ si } -\frac{\pi}{2} < u < 0]$$

Derivadas de las funciones hiperbólicas y de las hiperbólicas recíprocas

$$\frac{d}{dx} \operatorname{sinh} \operatorname{sinh} u = \operatorname{cosh} \operatorname{cosh} u \frac{du}{dx}$$

$$\frac{d}{dx} \operatorname{cosh} \operatorname{cosh} u = \operatorname{sinh} \operatorname{sinh} u \frac{du}{dx}$$

$$\frac{d}{dx} \operatorname{tanh} \operatorname{tanh} u = u \frac{du}{dx}$$

$$\frac{d}{dx} \operatorname{coth} \operatorname{coth} u = -u \frac{du}{dx}$$

$$\frac{d}{dx} u = -u \operatorname{tanh} \operatorname{tanh} u \frac{du}{dx}$$

$$\frac{d}{dx} u = -u \operatorname{coth} \operatorname{coth} u \frac{du}{dx}$$

$$\frac{d}{dx} \operatorname{sen} h^{-1} u = \frac{1}{\sqrt{u^2 + 1}} \frac{du}{dx}$$

$$\frac{d}{dx} \operatorname{cos} h^{-1} u = \frac{\pm 1}{\sqrt{u^2 - 1}} \frac{du}{dx}$$

[+ si $u > 0, u > 1$ - si $u < 0, u < -1$]

$$\frac{d}{dx} u = \frac{1}{1 - u^2} \frac{du}{dx} \quad [-1 < u < 1]$$

$$\frac{d}{dx} u = \frac{1}{1 - u^2} \frac{du}{dx} \quad [u > 1 \text{ o } u < -1]$$

$$\frac{d}{dx} \operatorname{sec} h^{-1} u = \frac{\pm 1}{u\sqrt{u^2 - 1}} \frac{du}{dx}$$

$$\left[\begin{array}{l} - \text{ si } \operatorname{sech}^{-1} u > 0, \quad 0 < u < 1 \\ + \text{ si } \operatorname{sech}^{-1} u < 0, \quad 0 < u < 1 \end{array} \right]$$

$$\frac{d}{dx} \operatorname{csc} h^{-1} u = \frac{-1}{|u|\sqrt{1+u^2}} \frac{du}{dx} = \frac{\mp 1}{u\sqrt{1+u^2}} \frac{du}{dx}$$

$$[- \text{ si } u > 0 + \text{ si } u < 0]$$

Tablas de integrales

$$\int u dv = uv - \int v du$$

$$\int u^n du = \frac{1}{n+1} u^{n+1} + C \quad n \neq -1$$

$$\int \frac{du}{u} = \ln|u| + C$$

$$\int e^u du = e^u + C$$

$$\int a^u du = \frac{a^u}{\ln a} + C$$

$$\int \operatorname{sen} u du = -\operatorname{cos} u + C$$

$$\int \operatorname{cos} u du = \operatorname{sen} u + C$$

$$\int \operatorname{sec}^2 u du = \operatorname{tan} u + C$$

$$\int \operatorname{csc}^2 u du = -\operatorname{cot} u + C$$

$$\int \operatorname{sec} u \operatorname{tan} u du = \operatorname{sec} u + C$$

$$\int \operatorname{csc} u \operatorname{cot} u du = -\operatorname{csc} u + C$$

$$\int \operatorname{tan} u du = \ln|\operatorname{sec} u| + C$$

$$\int \operatorname{cot} u du = \ln|\operatorname{sen} u| + C$$

$$\int \operatorname{sec} u du = \ln|\operatorname{sec} u + \operatorname{tan} u| + C$$

$$\int \operatorname{csc} u du = \ln|\operatorname{csc} u - \operatorname{cot} u| + C$$

$$\int \frac{du}{\sqrt{a^2 - u^2}} = \operatorname{sen}^{-1} \frac{u}{a} + C$$

$$\int \frac{du}{a^2 + u^2} = \frac{1}{a} \operatorname{tan}^{-1} \frac{u}{a} + C$$

$$\int \frac{du}{u\sqrt{u^2 - a^2}} = \frac{1}{a} \operatorname{sec}^{-1} \frac{u}{a} + C$$

$$\int \frac{du}{a^2 - u^2} = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{u+a}{u-a} \right| + C$$

$$\int \frac{du}{u^2 - a^2} = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{u-a}{u+a} \right| + C$$

$$\int \sqrt{a^2 + u^2} du = \frac{u}{2} \sqrt{a^2 + u^2} + \frac{a^2}{2} \ln|u + \sqrt{a^2 + u^2}| + C$$

$$\int u^2 \sqrt{a^2 + u^2} du = \frac{u}{8} (a^2 + 2u^2) \sqrt{a^2 + u^2} - \frac{a^2}{8} \ln|u + \sqrt{a^2 + u^2}| + C$$

$$\int \frac{\sqrt{a^2 + u^2}}{u} du = \sqrt{a^2 + u^2} - a \ln \left| \frac{a + \sqrt{a^2 + u^2}}{u} \right| + C$$

$$\int \frac{\sqrt{a^2 + u^2}}{u^2} du = -\frac{\sqrt{a^2 + u^2}}{u} + \ln|u + \sqrt{a^2 + u^2}| + C$$

$$\int \frac{du}{\sqrt{a^2 + u^2}} = \ln|u + \sqrt{a^2 + u^2}| + C$$

$$\int \frac{u^2 du}{\sqrt{a^2 + u^2}} = \frac{u}{2} \sqrt{a^2 + u^2} - \frac{a^2}{2} \ln|u + \sqrt{a^2 + u^2}| + C$$

$$\int \frac{du}{u\sqrt{a^2 + u^2}} = -\frac{1}{a} \ln \left| \frac{\sqrt{a^2 + u^2} + a}{u} \right| + C$$

$$\int \frac{du}{u^2 \sqrt{a^2 + u^2}} = -\frac{\sqrt{a^2 + u^2}}{a^2 u} + C$$

$$\int \frac{du}{(a^2 + u^2)^{3/2}} = \frac{u}{a^2 \sqrt{a^2 + u^2}} + C$$

$$\int \sqrt{a^2 - u^2} du = \frac{u}{2} \sqrt{a^2 - u^2} + \frac{a^2}{2} \operatorname{sen}^{-1} \frac{u}{a} + C$$

$$\int u^2 \sqrt{a^2 - u^2} du = \frac{u}{8} (2u^2 - a^2) \sqrt{a^2 - u^2} + \frac{a^4}{8} \operatorname{sen}^{-1} \frac{u}{a} + C$$

$$\int \frac{\sqrt{a^2 - u^2}}{u} du = \sqrt{a^2 - u^2} - a \ln \left| \frac{a + \sqrt{a^2 - u^2}}{u} \right| + C$$

$$\int \frac{\sqrt{a^2 - u^2}}{u^2} du = -\frac{1}{u} \sqrt{a^2 - u^2} - \operatorname{sen}^{-1} \frac{u}{a} + C$$

$$\int \frac{u^2 du}{\sqrt{a^2 - u^2}} = -\frac{u}{2} \sqrt{a^2 - u^2} + \frac{a^2}{2} \operatorname{sen}^{-1} \frac{u}{a} + C$$

$$\int \frac{du}{u\sqrt{a^2 - u^2}} = -\frac{1}{a} \ln \left| \frac{a + \sqrt{a^2 - u^2}}{u} \right| + C$$

$$\int \frac{du}{u^2 \sqrt{a^2 - u^2}} = -\frac{1}{a^2 u} \sqrt{a^2 - u^2} + C$$

$$\int (a^2 - u^2)^{3/2} du = -\frac{u}{8} (2u^2 - 5a^2) \sqrt{a^2 - u^2} + \frac{3a^4}{8} \operatorname{sen}^{-1} \frac{u}{a} + C$$

$$\int \frac{du}{(a^2 - u^2)^{3/2}} = \frac{u}{a^2 \sqrt{a^2 - u^2}} + C$$

$$\int \frac{udu}{a + bu} = \frac{1}{b^2} (a + bu - a \ln|a + bu|) + C$$

$$\int \frac{u^2 du}{a + bu} = \frac{1}{2b^3} [(a + bu)^2 - 4a(a + bu) + 2a^2 \ln|a + bu|] + C$$

$$\int \frac{du}{u(a + bu)} = \frac{1}{a} \ln \left| \frac{u}{a + bu} \right| + C$$

$$\int \sqrt{u^2 - a^2} du = \frac{u}{2} \sqrt{u^2 - a^2} - \frac{a^2}{2} \ln|u + \sqrt{u^2 - a^2}| + C$$

$$\int u^2 \sqrt{u^2 - a^2} du = \frac{u}{8} (2u^2 - a^2) \sqrt{u^2 - a^2} - \frac{a^4}{8} \ln|u + \sqrt{u^2 - a^2}| + C$$

$$\int \frac{\sqrt{u^2 - a^2}}{u} du = \sqrt{u^2 - a^2} - a \cos^{-1} \frac{a}{u} + C$$

$$\int \frac{\sqrt{u^2 - a^2}}{u^2} du = -\frac{\sqrt{u^2 - a^2}}{u} + \ln|u + \sqrt{u^2 - a^2}| + C$$

$$\int \frac{du}{\sqrt{u^2 - a^2}} = \ln|u + \sqrt{u^2 - a^2}| + C$$

$$\int \frac{u^2 du}{\sqrt{u^2 - a^2}} = \frac{u}{2} \sqrt{u^2 - a^2} + \frac{a^2}{2} \ln|u + \sqrt{u^2 - a^2}| + C$$

$$\int \frac{du}{u^2 \sqrt{u^2 - a^2}} = \frac{\sqrt{u^2 - a^2}}{a^2 u} + C$$

$$\int \frac{du}{(u^2 - a^2)^{3/2}} = -\frac{u}{a^2 \sqrt{u^2 - a^2}} + C$$

$$\int \frac{u^2 du}{\sqrt{a + bu}} = \frac{2}{15b^3} (8a^2 + 3b^2 u^2 - 4abu) \sqrt{a + bu}$$



$$\int \frac{du}{u^2(a+bu)} = -\frac{1}{au} + \frac{b}{a^2} \ln \left| \frac{a+bu}{u} \right| + C$$

$$\int \frac{udu}{(a+bu)^2} = \frac{a}{b^2(a+bu)} + \frac{1}{b} \ln|a+bu| + C$$

$$\int \frac{du}{u(a+bu)^2} = \frac{1}{a(a+bu)} - \frac{1}{a^2} \ln \left| \frac{a+bu}{u} \right| + C$$

$$\int \frac{u^2 du}{(a+bu)^2} = \frac{1}{b^3} \left(a+bu - \frac{a^2}{a+bu} - 2a \ln|a+bu| \right) + C$$

$$\int u\sqrt{a+bu} du = \frac{2}{15b^2} (3bu - 2a)(a+bu)^{\frac{3}{2}} + C$$

$$\int \frac{udu}{\sqrt{a+bu}} = \frac{2}{3b^2} (bu - 2a)\sqrt{a+bu}$$

$$\int \sin^2 u du = \frac{1}{2}u - \frac{1}{4}\sin 2u + C$$

$$\int \cos^2 u du = \frac{1}{2}u + \frac{1}{4}\sin 2u + C$$

$$\int \tan^2 u du = \tan u - u + C$$

$$\int \cot^2 u du = -\cot u - u + C$$

$$\int \sin^3 u du = -\frac{1}{3}(2 + \sin^2 u) \cos u + C$$

$$\int \cos^3 u du = \frac{1}{3}(2 + \cos^2 u) \sin u + C$$

$$\int \tan^3 u du = \frac{1}{2} \tan^2 u + \ln|\cos u| + C$$

$$\int \cot^3 u du = -\frac{1}{2} \cot^2 u - \ln|\sin u| + C$$

$$\int \sec^3 u du = \frac{1}{2} \sec u \tan u + \frac{1}{2} \ln|\sec u + \tan u| + C$$

$$\int \sin au \cos bu du = -\frac{\cos(a-b)u}{2(a-b)} - \frac{\cos(a+b)u}{2(a+b)} + C$$

$$\int \frac{du}{u\sqrt{a+bu}} = \frac{1}{\sqrt{a}} \ln \left| \frac{\sqrt{a+bu} - \sqrt{a}}{\sqrt{a+bu} + \sqrt{a}} \right| + C, \text{ si } a > 0$$

$$= \frac{2}{\sqrt{-a}} \tan^{-1} \sqrt{\frac{a+bu}{-a}} + C, \text{ si } a < 0$$

$$\int \frac{\sqrt{a+bu}}{u^2} du = -\frac{\sqrt{a+bu}}{u} + \frac{b}{2} \int \frac{du}{u\sqrt{a+bu}}$$

$$\int u^n \sqrt{a+bu} du = \frac{2}{b(2n+3)} \left[u^n (a+bu)^{\frac{3}{2}} - na \int u^{n-1} \sqrt{a+bu} du \right]$$

$$\int \frac{u^n du}{\sqrt{a+bu}} = \frac{2u^n \sqrt{a+bu}}{b(2n+1)} - \frac{2na}{b(2n+1)} \int \frac{u^{n-1} du}{\sqrt{a+bu}}$$

$$\int \frac{du}{u^n \sqrt{a+bu}} = -\frac{\sqrt{a+bu}}{a(n-1)u^{n-1}} - \frac{b(2n-3)}{2a(n-1)} \int \frac{du}{u^{n-1} \sqrt{a+bu}}$$

$$\int \csc^3 u du = -\frac{1}{2} \csc u \cot u + \frac{1}{2} \ln|\csc u - \cot u| + C$$

$$\int \sin^n u du = -\frac{1}{n} \sin^{n-1} u \cos u + \frac{n-1}{n} \int \sin^{n-2} u du$$

$$\int \cos^n u du = \frac{1}{n} \cos^{n-1} u \sin u + \frac{n-1}{n} \int \cos^{n-2} u du$$

$$\int \tan^n u du = \frac{1}{n-1} \tan^{n-1} u - \int \tan^{n-2} u du$$

$$\int \cot^n u du = \frac{-1}{n-1} \cot^{n-1} u - \int \cot^{n-2} u du$$

$$\int \sec^n u du = \frac{1}{n-1} \tan u \sec^{n-2} u + \frac{n-2}{n-1} \int \sec^{n-2} u du$$

$$\int \csc^n u du = \frac{1}{n-1} \cot u \csc^{n-2} u + \frac{n-2}{n-1} \int \csc^{n-2} u du$$

$$\int \sin au \sin bu du = \frac{\sin(a-b)u}{2(a-b)} - \frac{\sin(a+b)u}{2(a+b)} + C$$

$$\int \cos au \cos bu du = \frac{\sin(a-b)u}{2(a-b)} + \frac{\sin(a+b)u}{2(a+b)} + C$$

$$\int u^n \cos u du = u^n \sin u - n \int u^{n-1} \sin u du$$

$$\int u \operatorname{sen} u \, du = \operatorname{sen} u - u \operatorname{cos} u + C$$

$$\int u \operatorname{cos} u \, du = \operatorname{cos} u + u \operatorname{sen} u + C$$

$$\int u^n \operatorname{sen} u \, du = u^n \operatorname{cos} u + n \int u^{n-1} \operatorname{cos} u \, du$$

$$\int \operatorname{sen}^{-1} u \, du = u \operatorname{sen}^{-1} u + \sqrt{1-u^2} + C$$

$$\int \operatorname{cos}^{-1} u \, du = u \operatorname{cos}^{-1} u - \sqrt{1-u^2} + C$$

$$\int \tan^{-1} u \, du = u \tan^{-1} u - \frac{1}{2} \ln(1+u^2) + C$$

$$\int u \operatorname{sen}^{-1} u \, du = \frac{2u^2-1}{4} \operatorname{sen}^{-1} u + \frac{u\sqrt{1-u^2}}{4} + C$$

$$\int u e^{au} \, du = \frac{1}{a^2} (au-1) e^{au} + C$$

$$\int u^n e^{au} \, du = \frac{1}{a} u^n e^{au} - \frac{n}{a} \int u^{n-1} e^{au} \, du$$

$$\int e^{au} \operatorname{sen} bu \, du = \frac{e^{au}}{a^2+b^2} (a \operatorname{sen} bu - b \operatorname{cos} bu) + C$$

$$\int e^{au} \operatorname{cos} bu \, du = \frac{e^{au}}{a^2+b^2} (a \operatorname{cos} bu + b \operatorname{sen} bu) + C$$

$$\int \operatorname{senh} u \, du = \operatorname{cosh} u + C$$

$$\int \operatorname{cosh} u \, du = \operatorname{senh} u + C$$

$$\int \tanh u \, du = \ln \operatorname{cosh} u + C$$

$$\int \operatorname{coth} u \, du = \ln |\operatorname{senh} u| + C$$

$$\int \operatorname{sech} u \, du = \tan^{-1} |\operatorname{senh} u| + C$$

$$\int \operatorname{sen}^n u \operatorname{cos}^m u \, du$$

$$= -\frac{\operatorname{sen}^{n-1} u \operatorname{cos}^{m+1} u}{n+m} + \frac{n-1}{n+m} \int \operatorname{sen}^{n-2} u \operatorname{cos}^m u \, du$$

$$= -\frac{\operatorname{sen}^{n+1} u \operatorname{cos}^{m-1} u}{n+m} + \frac{m-1}{n+m} \int \operatorname{sen}^n u \operatorname{cos}^{m-2} u \, du$$

$$\int u \operatorname{cos}^{-1} u \, du = \frac{2u^2-1}{4} \operatorname{cos}^{-1} u - \frac{u\sqrt{1-u^2}}{4} + C$$

$$\int u \tan^{-1} u \, du = \frac{u^2+1}{2} \tan^{-1} u - \frac{u}{2} + C$$

$$\int u^n \operatorname{sen}^{-1} u \, du = \frac{1}{n+1} \left[u^{n+1} \operatorname{sen}^{-1} u - \int \frac{u^{n+1} \, du}{\sqrt{1-u^2}} \right], n \neq -1$$

$$\int u^n \operatorname{cos}^{-1} u \, du = \frac{1}{n+1} \left[u^{n+1} \operatorname{cos}^{-1} u + \int \frac{u^{n+1} \, du}{\sqrt{1-u^2}} \right], n \neq -1$$

$$\int u^n \tan^{-1} u \, du = \frac{1}{n+1} \left[u^{n+1} \tan^{-1} u - \int \frac{u^{n+1} \, du}{\sqrt{1+u^2}} \right], n \neq -1$$

$$\int \ln u \, du = u \ln u - u + C$$

$$\int u^n \ln u \, du = \frac{u^{n+1}}{(n+1)^2} [(n+1) \ln u - 1] + C$$

$$\int \frac{1}{u \ln u} \, du = \ln |\ln u| + C$$

$$\int \operatorname{sech} u \, du = \ln \left| \tan \frac{1}{2} u \right| + C$$

$$\int \operatorname{sech}^2 u \, du = \tanh u + C$$

$$\int \operatorname{csch}^2 u \, du = -\operatorname{coth} u + C$$

$$\int \operatorname{sech} u \tanh u \, du = -\operatorname{sech} u + C$$

$$\int \operatorname{csch} u \operatorname{coth} u \, du = -\operatorname{csch} u + C$$

$$\int \sqrt{2au-u^2} du = \frac{u-a}{2} \sqrt{2au-u^2} + \frac{a^2}{2} \cos^{-1}\left(\frac{a-u}{a}\right) + C$$

$$\int u\sqrt{2au-u^2} du = \frac{2u-au-3a^2}{6} \sqrt{2au-u^2} + \frac{a^3}{2} \cos^{-1}\left(\frac{a-u}{a}\right) + C$$

$$\int \frac{\sqrt{2au-u^2}}{u^2} du = \sqrt{2au-u^2} + a \cos^{-1}\left(\frac{a-u}{a}\right) + C$$

$$\int \frac{\sqrt{2au-u^2}}{u^2} du = -\frac{2\sqrt{2au-u^2}}{u} - \cos^{-1}\left(\frac{a-u}{a}\right) + C$$


$$\int \frac{u^2 du}{\sqrt{2au-u^2}} = -\frac{(u+3a)}{2} \sqrt{2au-u^2} + \frac{3a^2}{2} \cos^{-1}\left(\frac{a-u}{a}\right) + C$$

$$\int \frac{du}{\sqrt{2au-u^2}} = \cos^{-1}\left(\frac{a-u}{a}\right) + C$$

$$\int \frac{u du}{\sqrt{2au-u^2}} = -\sqrt{2au-u^2} + a \cos^{-1}\left(\frac{a-u}{a}\right) + C$$

$$\int \frac{du}{u\sqrt{2au-u^2}} = -\frac{\sqrt{2au-u^2}}{au} + C$$

Integrales múltiples

<p>Integrales dobles o integrales de área</p> 	$\int_{x=a}^b \int_{y=f_1(x)}^{f_2(x)} F(x,y) dy dx = \int_{x=a}^b \left\{ \int_{y=f_1(x)}^{f_2(x)} F(x,y) dy \right\} dx$ $\int_{y=c}^d \int_{x=g_1(y)}^{g_2(y)} F(x,y) dx dy = \int_{y=c}^d \left\{ \int_{x=g_1(y)}^{g_2(y)} F(x,y) dx \right\} dy$ <p>Estos conceptos se pueden ampliar para considerar integrales triples o de volumen así como integrales múltiples en más de tres dimensiones.</p>
--	--

Vectores, funciones vectoriales y operadores diferenciales

$$|\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}| = \|\mathbf{A}\| \|\mathbf{B}\| \cos \theta \quad 0 \leq \theta \leq \pi$$

donde θ es el ángulo formado por \mathbf{A} y \mathbf{B}

Producto punto

$$\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} = A_1 B_1 + A_2 B_2 + A_3 B_3$$

donde $\mathbf{A} = \langle A_1, A_2, \dots, A_n \rangle$ y $\mathbf{B} = \langle B_1, B_2, \dots, B_n \rangle$

$$\mathbf{A} \times \mathbf{B} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ A_1 & A_2 & A_3 \\ B_1 & B_2 & B_3 \end{vmatrix}$$

Producto cruz

$$= (A_2 B_3 - A_3 B_2) \hat{i} + (A_3 B_1 - A_1 B_3) \hat{j} + (A_1 B_2 - A_2 B_1) \hat{k}$$

donde $\mathbf{A} = A_1 \hat{i} + A_2 \hat{j} + A_3 \hat{k}$ y $\mathbf{B} = B_1 \hat{i} + B_2 \hat{j} + B_3 \hat{k}$

Magnitud del producto cruz

$$\|\mathbf{A} \times \mathbf{B}\| = \|\mathbf{A}\| \|\mathbf{B}\| \sin \theta$$

	En parámetro arbitrario:	En parámetros:
--	--------------------------	----------------

Vector tangente unitario	$\hat{t}(t) = \frac{\vec{r}'(t)}{\ \vec{r}'(t)\ }$	$\hat{t}(s) = \dot{\vec{r}}(s)$
Vector normal principal	$\hat{n}(t) = \hat{b}(t) \times \hat{t}(t)$	$\hat{n}(s) = \frac{\ddot{\vec{r}}(s)}{\ \ddot{\vec{r}}(s)\ }$
Vector binormal	$\hat{b}(t) = \frac{\vec{r}' \times \vec{r}''(t)}{\ \vec{r}' \times \vec{r}''(t)\ }$	$\hat{b}(s) = \frac{\dot{\vec{r}}(s) \times \ddot{\vec{r}}(s)}{\ \ddot{\vec{r}}(s)\ }$
Los vectores unitarios $\hat{t}, \hat{n}, \hat{b}$ guardan la relación $\hat{b} = \hat{t} \times \hat{n}, \hat{n} = \hat{b} \times \hat{t}, \hat{t} = \hat{n} \times \hat{b}$		

	Ecuación vectorial	
	$\vec{r}(\lambda) = \vec{r}(t_0) + \lambda \vec{r}'(t_0)$	
Recta tangente en t_0	Ecuación paramétrica	
	$\frac{x - x_0}{x'_0} = \frac{y - y_0}{y'_0} = \frac{z - z_0}{z'_0}$	
	Ecuación vectorial	
	$[\vec{r} - \vec{r}(t_0)] \cdot [\vec{r}'(t_0) \times \vec{r}''(t_0)] = 0$	
Plano osculador (\hat{t}, \hat{n}) en t_0	Ecuación paramétrica	
	$\begin{vmatrix} x - x_0 & y - y_0 & z - z_0 \\ x'_0 & y'_0 & z'_0 \\ x''_0 & y''_0 & z''_0 \end{vmatrix} = 0$	
	Ecuación vectorial	
	$(\vec{r} - \vec{r}(t_0)) \cdot \vec{r}'(t_0) = 0$	
Plano normal	Ecuación paramétrica	
	$x'_0(x - x_0) + y'_0(y - y_0) + z'_0(z - z_0) = 0$	
Plano Rectificante (\hat{t}, \hat{b}) en t_0	Ecuación vectorial	
	$(\vec{r} - \vec{r}(t_0)) \cdot \hat{n}(t_0) = 0$	
	$\kappa(t) = \frac{\ \vec{r}'(t) \times \vec{r}''(t)\ }{\ \vec{r}'(t)\ ^3}$	
Curvatura y Torsión	$\tau(t) = \frac{\vec{r}'(t) \cdot [\vec{r}''(t) \times \vec{r}'''(t)]}{\ \vec{r}'(t) \times \vec{r}''(t)\ ^2}$	
	$\kappa(s) = \ \ddot{\vec{r}}(s)\ $	$\kappa = \frac{ f''(x) }{[1 + (f'(x))^2]^{3/2}}$
Componentes Tangencial de la Aceleración	$a_T = \vec{a} \cdot \vec{T} = \frac{\vec{v} \cdot \vec{a}}{\ \vec{v}\ }$	
Componentes Normal de la Aceleración	$a_N = \vec{a} \cdot \vec{N} = \frac{\ \vec{v} \times \vec{a}\ }{\ \vec{v}\ }$	

Sean $U = U(x, y, z)$, una función escalar, y $\mathbf{A} = \mathbf{A}(x, y, z)$, una función vectorial, ambas con derivadas parciales

Operador *nabla*

$$\nabla = \frac{\partial}{\partial x} \hat{\mathbf{i}} + \frac{\partial}{\partial y} \hat{\mathbf{j}} + \frac{\partial}{\partial z} \hat{\mathbf{k}}$$

Gradiente de U

$$\text{grad } U = \nabla U = \left(\frac{\partial}{\partial x} \hat{\mathbf{i}} + \frac{\partial}{\partial y} \hat{\mathbf{j}} + \frac{\partial}{\partial z} \hat{\mathbf{k}} \right) U = \frac{\partial U}{\partial x} \hat{\mathbf{i}} + \frac{\partial U}{\partial y} \hat{\mathbf{j}} + \frac{\partial U}{\partial z} \hat{\mathbf{k}}$$

Laplaciano de U

$$\nabla^2 U = \nabla \cdot (\nabla U) = \frac{\partial^2 U}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 U}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 U}{\partial z^2}$$

Divergencia de \mathbf{A}

$$\begin{aligned} \text{div } \mathbf{A} = \nabla \cdot \mathbf{A} &= \left(\frac{\partial}{\partial x} \hat{\mathbf{i}} + \frac{\partial}{\partial y} \hat{\mathbf{j}} + \frac{\partial}{\partial z} \hat{\mathbf{k}} \right) \cdot \left(A_1 \hat{\mathbf{i}} + A_2 \hat{\mathbf{j}} + A_3 \hat{\mathbf{k}} \right) \\ &= \frac{\partial A_1}{\partial x} + \frac{\partial A_2}{\partial y} + \frac{\partial A_3}{\partial z} \end{aligned}$$

Rotacional de \mathbf{A}

$$\begin{aligned} \text{rot } \mathbf{A} = \nabla \times \mathbf{A} &= \left(\frac{\partial}{\partial x} \hat{\mathbf{i}} + \frac{\partial}{\partial y} \hat{\mathbf{j}} + \frac{\partial}{\partial z} \hat{\mathbf{k}} \right) \times \left(A_1 \hat{\mathbf{i}} + A_2 \hat{\mathbf{j}} + A_3 \hat{\mathbf{k}} \right) \\ &= \begin{vmatrix} \hat{\mathbf{i}} & \hat{\mathbf{j}} & \hat{\mathbf{k}} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ A_1 & A_2 & A_3 \end{vmatrix} \\ &= \left(\frac{\partial A_3}{\partial y} - \frac{\partial A_2}{\partial z} \right) \hat{\mathbf{i}} + \left(\frac{\partial A_1}{\partial z} - \frac{\partial A_3}{\partial x} \right) \hat{\mathbf{j}} + \left(\frac{\partial A_2}{\partial x} - \frac{\partial A_1}{\partial y} \right) \hat{\mathbf{k}} \end{aligned}$$

Propiedades de la Divergencia	$\nabla \cdot (\vec{F} + \vec{G}) = \nabla \cdot \vec{F} + \nabla \cdot \vec{G}$
	$\nabla \cdot (\phi \vec{F}) = \phi \nabla \cdot \vec{F} + (\nabla \phi) \cdot \vec{F}$
	$\nabla \cdot (\vec{F} \times \vec{G}) = \vec{G} \cdot (\nabla \times \vec{F}) - \vec{F} \cdot (\nabla \times \vec{G})$

Tabla de transformadas de Laplace

$$\{f(t)\} = \int_0^{\infty} e^{-s t} f(t) dt$$

No	$f(t)$	$F(s)$
1	C (constante)	$\frac{C}{s}$
2	t^n	$\frac{n!}{s^{n+1}}$, $n = 0$ y $n \in \mathbb{N}$
3	t^n	$\frac{\Gamma(n+1)}{s^{n+1}}$, $n > -1$
4	e^{at}	$\frac{1}{s - a}$
5	$\sinh(at)$	$\frac{a}{s^2 - a^2}$
6	$\cosh(at)$	$\frac{s}{s^2 - a^2}$
7	$\sen(kt)$	$\frac{k}{s^2 + k^2}$
8	$\cos(kt)$	$\frac{s}{s^2 + k^2}$
9	$e^{at} f(t)$	$F(s - a)$
10	$f(t - a)U(t - a)$	$e^{-as}F(s)$
11	$t^n f(t)$	$(-1)^n F^{(n)}(s)$
12	$\frac{f(t)}{t}$	$\int_s^{\infty} F(p) dp$
13	$f^{(n)}(t)$	$s^n F(s) - s^{n-1} f(0) - s^{n-2} f'(0) - \dots - f^{(n-1)}(0)$
14	$\int_0^t f(\tau) d\tau$	$\frac{F(s)}{s}$
15	$f * g = \int_0^t f(\tau) g(t - \tau) d\tau$	$F(s)G(s)$
16	$f(t)$ función periódica de periodo T	$\frac{1}{1 - e^{-sT}} \int_0^T f(t) e^{-st} dt$
17	$\delta(t)$	1
18	$\delta(t - t_0)$	$e^{-t_0 s}$

Serie de Fourier

$$f(t) = \frac{1}{2}a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} [a_n \cos(n\omega_0 t) + b_n \sin(n\omega_0 t)]$$

Periodo: T

Frecuencia angular: $\omega_0 = \frac{2\pi}{T}$

$$a_0 = \frac{2}{T} \int_0^T f(t) dt$$

$$a_n = \frac{2}{T} \int_0^T f(t) \cos(n\omega_0 t) dt$$

$$b_n = \frac{2}{T} \int_0^T f(t) \sin(n\omega_0 t) dt$$

Fórmulas Misceláneas

Área en coordenadas polares	$\frac{1}{2} \int_{\alpha}^{\beta} r^2 dr$
Ecuaciones paramétricas de la cicloide para $t \in R$	$x = a(t - \sin t) \quad y = a(1 - \cos t)$
Trabajo	$W = \int_a^b \vec{F} \cdot d\vec{r}, \text{Comp}(\vec{a}, \vec{b}) = \frac{ \vec{a} \cdot \vec{b} }{\ \vec{b}\ }$
Longitud de arco de $y = f(x)$ en $[a, b] = \int_a^b \sqrt{1 + (y')^2} dx$	$m = \int \int_R \rho(x, y) dA$ $M_x = \int \int_R y \rho(x, y) dA \quad M_y = \int \int_R x \rho(x, y) dA$
Centro de gravedad de una región plana	$\bar{x} = \frac{\int_a^b x f(x) dx}{\int_a^b f(x) dx} \quad \bar{y} = \frac{\frac{1}{2} \int_a^b [f(x)]^2 dx}{\int_a^b f(x) dx}$
Longitud de arco en forma paramétrica	$L = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} dt$
Momento de inercia de R respecto al origen	$I_o = \int \int_R (x^2 + y^2) \rho(x, y) dA$
Área de la superficie generada al girar la gráfica f alrededor de x	$S = \int_a^b 2\pi f(x) \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx$
Volumen del sólido de revolución generado al girar la gráfica de f alrededor del eje y	$V = \int_a^b 2\pi t f(t) dt$

Cálculo del volumen	$V = \int_a^b A(x)dx \quad V = \int_a^b \pi(f(x))^2 dx$
Ecuación del resorte helicoidal	$r^{\rightarrow}(t) = \left(\cos t, \sin t, \frac{t}{2\pi} \right)$
Derivada direccional	$D_{\hat{u}}f(x, y, z) = \nabla f(x, y, z) \cdot \hat{u} \quad \hat{u}: \text{Vector unitario}$
Ecuación satisfecha por la carga de un circuito LRC	$Lq'' + Rq' + \frac{1}{C}q = E(t)$
Fuerza ejercida por un fluido	$F = \int_a^b \gamma y \cdot L(y)dy$
Fuerza que actúa sobre un líquido encerrado en un tubo	$F = \delta A 2x_0 g - \delta A 2x g$
Método numérico de Newton-Raphson	$x_{i+1} = x_i - \frac{f'(x_i)}{f(x_i)}$

Herramientas estadísticas

$$\text{Anchura de clase} \approx \frac{(\text{valor más alto}) - (\text{valor más bajo})}{\text{número de clases}}$$

$$\text{frecuencia relativa} = \frac{\text{frecuencia de clase}}{\text{suma de todas las frecuencias}}$$

$$\text{frecuencia porcentual} = \frac{\text{frecuencia de clase}}{\text{suma de todas las frecuencias}} \times 100\%$$

x es la *variable* que generalmente se usa para representar los datos individuales.

n representa el *número de datos* en una *muestra*.

N representa el *número de datos* en una *población*.

$\bar{x} = \frac{\sum x}{n}$ es la media de un conjunto de datos *muestrales*.

$\mu = \frac{\sum x}{N}$ es la media de todos los datos de una *población*.

$$\text{mitad del rango} = \frac{\text{valor máximo} + \text{valor mínimo}}{2}$$

media de la distribución de frecuencias: $\bar{x} = \frac{\sum(f \cdot x)}{\sum f}$

$$\text{media ponderada: } \bar{x} = \frac{\sum(w \cdot x)}{\sum w}$$

$$\text{media cuadrática} = \sqrt{\frac{\sum x^2}{n}}$$

$$\text{Mediana} = (\text{límite inferior de clase de la mediana}) + (\text{anchura de clase}) \left(\frac{\left(\frac{n+1}{2}\right) - (m+1)}{\text{frecuencia de clase de la mediana}} \right)$$

$$\text{rango} = (\text{valor máximo}) - (\text{valor mínimo})$$

$$s = \sqrt{\frac{\sum (x - \bar{x})^2}{n - 1}} \quad \text{desviación estándar de una muestra}$$

$$\text{desviación estándar de la población} \quad \sigma = \sqrt{\frac{\sum (x - \mu)^2}{N}}$$

$$s = \sqrt{\frac{n[\sum (f \cdot x^2)] - [\sum (f \cdot x)]^2}{n(n - 1)}} \quad \text{desviación estándar de una distribución de frecuencias}$$

Valor estandarizado:

$$\begin{array}{cc} \text{Muestra} & \text{Población} \\ z = \frac{x - \bar{x}}{s} & \text{o} \quad z = \frac{x - \mu}{\sigma} \end{array}$$


$$\text{percentil del valor } x = \frac{\text{número de valores menores que } x}{\text{número total de valores}} \cdot 100$$

$$\text{rango intercuartil (o RIC)} = Q_3 - Q_1$$

$$\text{rango semi-intercuartil} = \frac{Q_3 - Q_1}{2}$$

$$\text{cuartil medio} = \frac{Q_3 + Q_1}{2}$$

$$\text{rango de percentiles 10-90} = P_{90} - P_{10}$$



$$P(A) = \frac{\text{número de formas en que puede ocurrir } A}{\text{número de eventos simples diferentes}}$$

$$P(A \text{ o } B) = P(A) + P(B) - P(A \text{ y } B)$$

$$P(A) + P(\bar{A}) = 1$$

$$P(\bar{A}) = 1 - P(A)$$

$$P(A) = 1 - P(\bar{A})$$

$$P(A \text{ y } B) = P(A) \cdot P(B|A)$$

$${}_n P_r = \frac{n!}{(n-r)!}$$

$${}_n C_r = \frac{n!}{(n-r)! r!}$$

$$\mu = \Sigma[x \cdot P(x)] \quad \text{Media de una distribución de probabilidad}$$

$$\sigma = \sqrt{\Sigma[x^2 \cdot P(x)] - \mu^2} \quad \text{Desviación estándar de una distribución de probabilidad}$$

$$\mu = \frac{\Sigma(f \cdot x)}{N} = \Sigma\left[\frac{f \cdot x}{N}\right] = \Sigma\left[x \cdot \frac{f}{N}\right] = \Sigma[x \cdot P(x)]$$

$$\sigma = \sqrt{\Sigma[(x - \mu)^2 \cdot P(x)]}$$

$$E = \Sigma[x \cdot P(x)]$$

Distribución binomial

$$P(x) = \frac{n!}{(n-x)! x!} \cdot p^x \cdot q^{n-x} \quad \text{para } x = 0, 1, 2, \dots, n$$

$$\mu = np$$

$$\sigma^2 = npq$$

$$\sigma = \sqrt{npq}$$


Distribución de Poisson

$$P(x) = \frac{\mu^x \cdot e^{-\mu}}{x!}$$

$$\mu = np$$

$$\sigma = \sqrt{\mu}$$

Distribución Normal



$$y = \frac{e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2}}{\sigma\sqrt{2\pi}}$$

Puntuaciones z POSITIVAS

Área acumulativa desde la IZQUIERDA										
z	.00	.01	.02	.03	.04	.05	.06	.07	.08	.09
0.0	.5000	.5040	.5080	.5120	.5160	.5199	.5239	.5279	.5319	.5359
0.1	.5398	.5438	.5478	.5517	.5557	.5596	.5636	.5675	.5714	.5753
0.2	.5793	.5832	.5871	.5910	.5948	.5987	.6026	.6064	.6103	.6141
0.3	.6179	.6217	.6255	.6293	.6331	.6368	.6406	.6443	.6480	.6517
0.4	.6554	.6591	.6628	.6664	.6700	.6736	.6772	.6808	.6844	.6879
0.5	.6915	.6950	.6985	.7019	.7054	.7088	.7123	.7157	.7190	.7224
0.6	.7257	.7291	.7324	.7357	.7389	.7422	.7454	.7486	.7517	.7549
0.7	.7580	.7611	.7642	.7673	.7704	.7734	.7764	.7794	.7823	.7852
0.8	.7881	.7910	.7939	.7967	.7995	.8023	.8051	.8078	.8106	.8133
0.9	.8159	.8186	.8212	.8238	.8264	.8289	.8315	.8340	.8365	.8389
1.0	.8413	.8438	.8461	.8485	.8508	.8531	.8554	.8577	.8599	.8621
1.1	.8643	.8665	.8686	.8708	.8729	.8749	.8770	.8790	.8810	.8830
1.2	.8849	.8869	.8888	.8907	.8925	.8944	.8962	.8980	.8997	.9015
1.3	.9032	.9049	.9066	.9082	.9099	.9115	.9131	.9147	.9162	.9177
1.4	.9192	.9207	.9222	.9236	.9251	.9265	.9279	.9292	.9306	.9319
1.5	.9332	.9345	.9357	.9370	.9382	.9394	.9406	.9418	.9429	.9441
1.6	.9452	.9463	.9474	.9484	.9495	*.9505	.9515	.9525	.9535	.9545
1.7	.9554	.9564	.9573	.9582	.9591	↑.9599	.9608	.9616	.9625	.9633
1.8	.9641	.9649	.9656	.9664	.9671	↑.9678	.9686	.9693	.9699	.9706
1.9	.9713	.9719	.9726	.9732	.9738	↑.9744	.9750	.9756	.9761	.9767
2.0	.9772	.9778	.9783	.9788	.9793	↑.9798	.9803	.9808	.9812	.9817
2.1	.9821	.9826	.9830	.9834	.9838	↑.9842	.9846	.9850	.9854	.9857
2.2	.9861	.9864	.9868	.9871	.9875	↑.9878	.9881	.9884	.9887	.9890
2.3	.9893	.9896	.9898	.9901	.9904	↑.9906	.9909	.9911	.9913	.9916
2.4	.9918	.9920	.9922	.9925	.9927	↑.9929	.9931	.9932	.9934	.9936
2.5	.9938	.9940	.9941	.9943	.9945	↑.9946	.9948	.9949	*.9951	.9952
2.6	.9953	.9955	.9956	.9957	.9959	↑.9960	.9961	.9962	↑.9963	.9964
2.7	.9965	.9966	.9967	.9968	.9969	↑.9970	.9971	.9972	↑.9973	.9974
2.8	.9974	.9975	.9976	.9977	.9977	↑.9978	.9979	.9979	↑.9980	.9981
2.9	.9981	.9982	.9982	.9983	.9984	↑.9984	.9985	.9985	↑.9986	.9986
3.0	.9987	.9987	.9987	.9988	.9988	↑.9989	.9989	.9989	↑.9990	.9990
3.1	.9990	.9991	.9991	.9991	.9992	↑.9992	.9992	.9992	↑.9993	.9993
3.2	.9993	.9993	.9994	.9994	.9994	↑.9994	.9994	.9995	↑.9995	.9995
3.3	.9995	.9995	.9995	.9996	.9996	↑.9996	.9996	.9996	↑.9996	.9997
3.4	.9997	.9997	.9997	.9997	.9997	↑.9997	.9997	.9997	↑.9997	.9998
3.50	.9999									

NOTA: En el caso de valores de z por encima de 3.49, utilice 0.9999 para el área.
 *Utilice estos valores comunes que resultan de la interpolación:

Puntuación z	Área
1.645	0.9500 ←
2.575	0.9950 ←

Valores críticos comunes

Niveles de confianza	Valor crítico
0.90	1.645
0.95	1.96
0.99	2.575

$$\bar{x} - E < \mu < \bar{x} + E \quad \text{donde} \quad E = z_{\alpha/2} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$



Correlación lineal

$$r = \frac{n(\sum xy) - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{n(\sum x^2) - (\sum x)^2} \sqrt{n(\sum y^2) - (\sum y)^2}}$$

Regresión lineal

$$\hat{y} = b_0 + b_1x$$

$$b_1 = \frac{n(\sum xy) - (\sum x)(\sum y)}{n(\sum x^2) - (\sum x)^2}$$

$$b_0 = \frac{(\sum y)(\sum x^2) - (\sum x)(\sum xy)}{n(\sum x^2) - (\sum x)^2}$$

FÍSICA

Cinemática

$\vec{r} = x\hat{i} + y\hat{j} + z\hat{k}$
$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt}$
$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt}$
$\vec{a} = \frac{dv}{dt}\hat{u}_t + \frac{v^2}{\rho}\hat{u}_n, \vec{v} = v\hat{u}_t$
$\vec{v} = \dot{r}\hat{u}_r + r\dot{\theta}\hat{u}_\theta$
$\vec{a} = (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2)\hat{u}_r + (r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta})\hat{u}_\theta$

Movimiento en una dimensión

$x = x_0 + vt$
$\bar{v} = \frac{1}{2}(v + v_0)$
$v = v_0 + at$
$x = x_0 + v_0t + \frac{1}{2}at^2$
$v^2 = v_0^2 + 2a(x - x_0)$
$\frac{X_B}{A} = X_B - X_A$
$\frac{V_B}{A} = V_B - V_A$
$\frac{a_B}{A} = a_B - a_A$

Estática

<p>$\vec{F} = F_x\hat{i} + F_y\hat{j}$ Componentes rectangulares de \vec{F} en el plano</p> <p>$F_x = F \cos \theta$, $F_y = F \sin \theta$</p> $F = \sqrt{F_x^2 + F_y^2}$ $\tan \theta = \frac{F_y}{F_x}$
<p>$\vec{F} = F_x\hat{i} + F_y\hat{j} + F_z\hat{k}$ Componentes rectangulares de \vec{F} en el espacio</p> <p>$F_x = F \cos \theta_x$, $F_y = F \cos \theta_y$, $F_z = F \cos \theta_z$</p> <p>$\theta_x + \theta_y + \theta_z = 1$</p> <p>$\cos \theta_x = \frac{d_x}{d}, \cos \theta_y = \frac{d_y}{d}, \cos \theta_z = \frac{d_z}{d} \Rightarrow \hat{\lambda} = \frac{F}{d}(d_x\hat{i} + d_y\hat{j} + d_z\hat{k})$</p> $F = \sqrt{F_x^2 + F_y^2 + F_z^2}$

$\vec{M}_O = \vec{r} \times \vec{F}$ Momento de F con respecto a O
$\vec{M}_B = \vec{r}_A \times \vec{F} = (\vec{r}_A - \vec{r}_B) \times \vec{F}$ Momento de F aplicada en A relativo a B
$M_{OL} = \hat{\lambda} \cdot \vec{M}_O = \hat{\lambda} \cdot (\vec{r} \times \vec{F})$ Momento de F respecto a un eje
$\vec{r} \times (\vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \dots) = \vec{r} \times \vec{F}_1 + \vec{r} \times \vec{F}_2 + \dots$ Teorema de Varignon
$\sum \vec{F} = \sum \vec{F}'$ Condiciones de sistemas equivalentes
$\sum \vec{M}_O = \sum \vec{M}_O'$
$\vec{R} = \sum \vec{F} = 0$ Condiciones de equilibrio
$\vec{M}_O^R = \sum \vec{M}_O = \sum (\vec{r} \times \vec{F}) = 0$

Dinámica

$\vec{F} = m\vec{a} = \left(\frac{W}{g}\right)\vec{a}, W: \text{peso}$
$F = G \frac{mM}{r^2}$
$\sum F = m \frac{dv}{dt}$

Impulso y cantidad de movimiento

$\vec{p} = m\vec{v}, p: \text{ímpetu o cantidad de movimiento}$
$\vec{I} = \int \vec{F} dt, I: \text{impulso}$
$\vec{I} = \Delta\vec{p} = \vec{p}_f - \vec{p}_i$

Trabajo, energía y conservación de la energía

$U = \vec{F} \cdot \vec{r}$
$P = \frac{U}{t} = \frac{\vec{F} \cdot \vec{r}}{t} = \vec{F} \cdot \vec{v}, P: \text{potencia}$
$\eta = \frac{P_{sal}}{P_{ent}}, \eta: \text{eficiencia}$
$U = \Delta K = K_f - K_i$
$K = \frac{1}{2}mv^2, K: \text{cinética}$
$W = -\Delta V = V_f - V_i, V: \text{potencial}$
$V(y) = mgy$
$V_e = \frac{1}{2}kx^2$

Electricidad y magnetismo

$\vec{F} = k \frac{q_1 q_2}{r^2} \left(\frac{\vec{r}}{r}\right) \vec{F} = k \frac{q_1 q_2}{r^2} \quad \vec{r} = \vec{r}_1 - \vec{r}_2$
--

$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q}$
$\Phi_E = \int \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{q}{\epsilon_0}, \Phi_E: \text{eléctrico}$
$V = k \frac{q}{r}, V: \text{electrostático}$
$V_{ab} = V_b - V_a = \frac{U_b - U_a}{q} = -\frac{W_{ab}}{q} = -\int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{l}$
$U = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{\text{pares } ij} \frac{Q_i Q_j}{r_{ij}} \quad U = \text{energía potencial electrostática}$

Capacitancia

$q = CV, C: \text{capacitancia}$
$C = \kappa\epsilon_0 \frac{A}{d}, \text{ de placas paralelas}$
$C = \epsilon \frac{A}{d} \quad \epsilon = \kappa\epsilon_0, k: \text{constante dieléctrica}$
$C = \kappa\epsilon_0 \frac{2\pi l}{\ln\left(\frac{b}{a}\right)}, \text{ cilíndrico}$
$U = \frac{q^2}{2C} = \frac{1}{2} CV^2 = \frac{1}{2} qV,$
$U: \text{energía almacenada en un capacitor}$
$u = \frac{1}{2} \kappa\epsilon_0 E^2, u: \text{densidad de energía}$

Corriente, resistencia y fuerza electromotriz

$i = \frac{dq}{dt}, i: \text{corriente eléctrica}$
$i = nqvA$
$j = \frac{i}{A} = \sum_i n_i q_i v_i, j: \text{densidad de corriente}$
$\rho = \frac{E}{j}, \rho: \text{resistividad}$
$R = \frac{V}{i} = \rho \frac{l}{A}, R: \text{resistencia}$
$R = R_0 (1 + \alpha \Delta t), \text{ Variación de } R \text{ con la temperatura}$
$V_{ab} = \sum IR - \sum \epsilon$
$\sum i_{ent} = \sum i_{sal}$
$\sum \text{Elev. de potencial} = \sum \text{caídas de potencial},$
$\sum_{\text{Algebraica}} v_i = 0$
$P = iV = i^2 R = \frac{V^2}{R}, P: \text{potencia eléctrica}$

Magnetismo

$\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B} = qvB\alpha$, \vec{v} : velocidad
$\vec{F} = i\vec{l} \times \vec{B} = liB\alpha$, \vec{B} : campo magnético \vec{l} : elemento de longitud
$\tau = NiAB\theta$
$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 i$
$\Phi = \oint \vec{B} \cdot d\vec{A}$
$B = \frac{\mu_0 i}{2\pi r}$, r : distancia
$B = \frac{\mu_0 i}{2a}$, a : radio
$B = \frac{\mu_0 Ni}{2\pi r}$, N : número de vueltas
$dB = \frac{\mu_0 i}{4\pi a} \text{sen } \theta \, d\theta$
$B = \frac{i}{4\pi a} (\cos \theta_1 - \cos \theta_2)$
$\varepsilon = -\frac{d\Phi_B}{dt}$, ε : fuerza electromotriz
$\varepsilon = -vBl$

Termodinámica

$\eta = 1 - \frac{T_F}{T_C}$, η : eficiencia
$\eta = \frac{W_S}{Q_E}$
$Q = mC_p \Delta T$
$\Delta L = \alpha L_0 \Delta T$ $\Delta A = 2\alpha A_0 \Delta T$ $\Delta V = 3\alpha V_0 \Delta T$
$PV = mRT$
$R = \frac{\bar{R}_u}{M}$

Primera Ley de la Termodinámica

$W = -\int p \, dv$, Trabajo
$Q = \Delta U + W$, Sistemas cerrados
$Q = \Delta H + W_u$, Sistemas abiertos
$H = U + PV$, Entalpía
$q_V = -\Delta U$
$q_P = -\Delta H$

$\Delta H = \Delta U + RT\Delta n_{gas}$
$\Delta H_r^0 = \Delta H_{r_{productos}}^0 - \Delta H_{r_{reactivos}}^0$
$C = C_p m, \text{Capacidad calorífica}$

Segunda Ley de la Termodinámica

Relaciones entre funciones termodinámicas

$dU = TdS - PdV$
$dH = TdS + VdP$
$dF = -SdT - PdV$
$dG = -SdT + VdP$

$\Delta H_r^0 = \Delta H_{f.n}^0 - \Delta H_{f.r}^0, \text{Ley de Hess}$
$F = U - TS, \text{Funciones Termodinámicas}$ $G = H - TS$
$\frac{dP}{dT} = \frac{\Delta H_0}{T\Delta V_m} = \frac{\Delta S}{\Delta V}, \text{Ecuación de Clapeyron}$
$\ln \ln \frac{P_2}{P_1} = \frac{\Delta H_0}{R} \left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2} \right), \text{Ecuación de Clausius-Clapeyron}$

Electroquímica

$m = \frac{Mit}{zF}, F: \text{constante de Faraday}$ $z: \text{número de electrones transferidos}$ $I: \text{intensidad de corriente}$
$\Delta G^0 = -nFE_{celda}^0 = -RT \ln \ln k_{eq}$
$E = E^0 - \frac{0.0592}{n} \log \log k \quad @298 K$
$E = E^0 - \frac{2.303RT}{nF} \log \log k$

Óptica

$n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2, \text{Ley de Snell}$
$n = \frac{c}{v}, n: \text{índice de refracción}$ $c: \text{velocidad de la luz en el vacío}$

Mecánica de fluidos

$P = P_0 + \rho gh$, ρ : densidad del fluido
$P = \frac{F}{A}$
$P_1 + \rho gy_1 + \frac{1}{2}\rho v_1^2 = P_2 + \rho gy_2 + \frac{1}{2}\rho v_2^2$, ecuación de Bernoulli
$Q = vA$, Q : gasto
$v_1 A_1 = v_2 A_2$, ecuación de continuidad

Constantes

Carga electrón	$-1.6022 \times 10^{-19} C$
Carga protón	$+1.6022 \times 10^{-19} C$
Masa electrón	$m_e = 9.1095 \times 10^{-31} kg$
Masa protón	$m_p = 1.67252 \times 10^{-27} kg$
Masa neutrón	$m_n = 1.679 \times 10^{-27} kg$
Constante de Planck	$h = 6.626 \times 10^{-34} J \cdot s$ $= 6.626 \times 10^{-27} erg \cdot s$
Constante de Rydberg	$R_H = 2.179 \times 10^{-18} J = 2.179 \times 10^{-11} erg$
Constante de Coulomb	$k = 9 \times 10^9 \frac{N \cdot m^2}{C^2}$
Constante dieléctrica o de permisividad de	$\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \frac{C^2}{(N \cdot m^2)}$ $= 8.85 \times 10^{-12} \frac{F}{m}$
Constante de Faraday	$F = 96484556 \frac{C}{mol}$
Constante de Boltzmann	$k = 1.3806 \times 10^{-23} \frac{J}{K}$
Constante de Stefan – Boltzmann	$\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \frac{W}{(m^2 K^4)}$
Constante gravitacional	$G = 6.672 \times 10^{-11} \frac{N \cdot m^2}{kg^2}$
Constante de permeabilidad	$1.26 \times 10^{-6} \frac{H}{m}$
Constante universal de los gases	$R = 8.314 \frac{J}{mol \cdot K} = 8.314 \frac{Pa \cdot m^3}{mol \cdot K}$ $= 0.0821 \frac{L \cdot atm}{mol \cdot K}$
Permeabilidad magnética del vacío	$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} T \cdot m = 1.2566 \times 10^{-6} \frac{H}{m}$
Magnetón de Bohr	$\mu_B = 9.274 \times 10^{-27} \frac{J}{T}$
Electrón – volt	$eV = 1.60 \times 10^{-19} J$



<i>Unidad de masa atómica (uma)</i>	$u = 1.6605 \times 10^{-27} \text{ kg}$
<i>Número de Avogadro</i>	$N_A = 6.023 \times 10^{23}$
<i>Volumen molar</i>	$V_m = 22.4 \text{ L}$
<i>Punto triple del agua</i>	$T_\pi = 273.15 \text{ K}$
<i>Velocidad de la luz</i>	$c = 3 \times 10^8 \frac{\text{m}}{\text{s}}$
<i>Radio medio de la Tierra</i>	$r_{mT} = 6.37 \times 10^6 \text{ m}$
<i>Distancia de la Tierra a la Luna</i>	$d_{T-L} = 3.84 \times 10^8 \text{ m}$
<i>Masa de la Tierra</i>	$m_t = 5.976 \times 10^{24} \text{ kg}$
<i>Masa de la Luna</i>	$m_l = 7.36 \times 10^{22} \text{ kg}$
<i>Aceleración gravitacional en la Tierra</i>	$g = 9.81 \text{ m/s}^2$
<i>Aceleración gravitacional en la Luna</i>	$g_l = 1.62 \text{ m/s}^2$

Factores de conversión

$1 \text{ N} = 0.2248 \text{ lb} = 10^5 \text{ dina}$
$1 \text{ kcal} = 4186.8 \text{ J} = 3.97 \text{ Btu} = 3087.5 \text{ lb} \cdot \text{pie} = 1.56 \times 10^{-3} \text{ Hph} = 632.18 \text{ CVh}$
$1 \text{ Btu} = 0.252 \text{ kcal} = 778 \text{ lb} \cdot \text{pie}$
$1 \text{ Hph} = 1.014 \text{ CVh}$
$1 \text{ W} = 0.860 \frac{\text{kcal}}{\text{h}}$
$1 \text{ J} = 2.778 \times 10^{-7} \text{ kWh} = 9.481 \times 10^{-4} \text{ Btu} = 10^7 \text{ erg} = 6.242 \times 10^{18} \text{ eV} = 0.2389 \text{ cal}$
$1 \text{ eV} = 1.6 \times 10^{-12} \text{ erg}$
$1 \text{ Hp} = 550 \frac{\text{lb} \cdot \text{pie}}{\text{s}} = 745.7 \text{ W} = 2545 \frac{\text{Btu}}{\text{h}} = 178.1 \frac{\text{kcal}}{\text{s}}$
$1 \text{ T} = 10^5 \text{ G}$
$1 \text{ mi} = 1609 \text{ m}$
$1 \text{ pie} = 30.48 \text{ cm}$
$1 \text{ bar} = 10^5 \text{ Pa} = 14.5 \frac{\text{lb}}{\text{in}^2}$
$1 \text{ lb}_m = 454 \text{ g}$
$1 \text{ atm} = 14.7 \frac{\text{lb}}{\text{in}^2} = 1.013 \times 10^5 \text{ Pa} = 760 \text{ mm Hg}$
$1 \text{ \AA} = 10^{-10} \text{ m} = 10^{-8} \text{ cm} = 10 \text{ nm}$
$1 \text{ nm} = 10^{-9} \text{ m}$
$K = ^\circ C + 273.15$



Tabla de pesos atómicos

INTERNACIONALES, 1965
BASADOS EN LA MASA ATÓMICA DE $^{12}\text{C} = 12$

<i>Elemento</i>	<i>Símbolo</i>	<i>Número Atómico</i>	<i>Peso Atómico</i>	<i>Electronegatividad</i>
Aluminio	Al	13	26.9815	1.5
Antimonio	Sb	51	121.75	1.9
Argon	Ar	18	39.948	
Arsénico	As	33	74.9216	2.0
Azufre	S	16	32.064	2.5
Bario	Ba	56	137.34	0.9
Berilio	Be	4	9.0122	1.5
Bismuto	Bi	83	208.980	1.9
Boro	B	5	10.811	2.0
Bromo	Br	35	79.909	2.8
Cadmio	Cd	48	112.40	1.7
Calcio	Ca	20	40.08	1.0
Carbono	C	6	12.01115	2.5
Cerio	Ce	58	140.12	
Cesio	Cs	55	132.905	0.7
Cloro	Cl	17	35.453	3.0
Cobalto	Co	27	58.9332	1.8
Cobre	Cu	29	63.54	1.9
Cromo	Cr	24	51.996	1.6
Disproscio	Dy	66	162.50	
Erbio	Er	68	167.26	
Escandio	Sc	21	44.956	
Estaño	Sn	50	118.69	1.8
Estroncio	Sr	38	87.62	1.0
Europio	Eu	63	151.96	
Fierro	Fe	26	55.847	1.8
Fluor	F	9	18.9984	4.0
Fósforo	P	15	30.9738	2.1
Gadolinio	Gd	64	157.25	
Galio	Ga	31	69.72	
Germanio	Ge	32	72.59	
Hafnio	Hf	72	178.49	1.3
Helio	He	2	4.0026	
Holmio	Ho	67	164.930	
Hidrógeno	H	1	1.00797	2.1
Indio	In	49	114.82	
Iridio	Ir	77	192.2	2.2
Kriptón	Kr	36	83.80	
Lantano	La	57	138.91	1.1
Litio	Li	3	6.939	1.0



<i>Elemento</i>	<i>Símbolo</i>	<i>Número Atómico</i>	<i>Peso Atómico</i>	<i>Electronegatividad</i>
Lutecio	Lu	71	174.97	1.2
Magnesio	Mg	12	24.305	1.2
Manganeso	Mn	25	54.9380	1.5
Mercurio	Hg	80	200.59	1.9
Molibdeno	Mo	42	95.94	1.8
Neodimio	Nd	60	144.24	
Neón	Ne	10	20.179	
Niobio	Nb	41	92.906	1.6
Níquel	Ni	28	58.71	1.8
Nitrógeno	N	7	14.0067	3.0
Oro	Au	79	196.967	2.4
Osmio	Os	76	190.2	2.2
Oxígeno	O	8	15.9994	3.5
Paladio	Pd	46	106.4	2.2
Plata	Ag	47	107.870	1.9
Platino	Pt	78	195.09	2.2
Plomo	Pb	82	207.19	1.8
Potasio	K	19	39.102	0.8
Praseodimio	Pr	59	140.907	
Radio	Ra	88	226.00	0.9
Renio	Re	75	186.2	1.9
Rodio	Rh	45	102.905	2.2
Rubidio	Rb	37	85.47	0.8
Rutenio	Ru	44	101.07	
Samario	Sm	62	150.35	
Selenio	Se	34	78.96	2.4
Silicio	Si	14	28.086	1.8
Sodio	Na	11	22.9898	0.9
Talio	Tl	81	204.37	1.8
Tantalo	Ta	73	180.948	1.5
Teluro	Te	52	127.60	2.1
Terbio	Tb	65	158.924	
Titanio	Ti	22	47.90	1.5
Torio	Th	90	232.038	1.3
Tulio	Tm	69	168.934	
Tungsteno	W	74	183.85	1.7
Uranio	U	92	238.03	1.7
Vanadio	V	23	50.942	1.6
Xenón	Xe	54	131.30	
Yodo	I	53	126.9044	2.5
Yterbio	Yb	70	173.04	
Ytrio	Y	39	88.905	1.2
Zinc	Zn	30	65.37	1.6
Zirconio	Zr	40	91.22	1.4



Valores de constantes físicas y químicas

Número de Avogadro	$6,0222 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$
Faraday	96490 C mol^{-1}
Constante universal de los gases	$8,3143 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$
Volumen molar normal de un gas	2,415 L
Cero absoluto	$-273,15 \text{ °C}$

Concentración de disoluciones

Porcentaje	$\text{por ciento en peso (p/p)} = \frac{\text{peso del soluto}}{\text{peso de la disolución}} \times 100\%$ $\text{por ciento en volumen (v/v)} = \frac{\text{volumen del soluto}}{\text{volumen de la disolución}} \times 100\%$ $\text{por ciento en peso/volumen (p/v)} = \frac{\text{peso del soluto}}{\text{volumen de la disolución, mL}} \times 100\%$
ppm	$\text{ppm} = \frac{\text{masa de soluto (g)}}{\text{masa de disolución (g)}} \times 10^6$
Molalidad	$m = \text{no. moles} / \text{kilogramos de disolvente}$
Molaridad	$M = \text{no. moles} / V$
Normalidad	$N = \text{eq} / V$

Datos termodinámicos para compuestos orgánicos a 298 K

	$M(\text{gmol}^{-1})$	$\Delta H_f^\circ \left(\frac{\text{kJ}}{\text{mol}} \right)$	$\Delta G_f^\circ \left(\frac{\text{kJ}}{\text{mol}} \right)$	$S_f^\circ \left(\frac{\text{J}}{\text{mol K}} \right)$	$C_p \left(\frac{\text{J}}{\text{mol K}} \right)$	$\Delta H_s^\circ \left(\frac{\text{kJ}}{\text{mol}} \right)$
C(s) (grafito)	12,011	0	0	5,740	8,527	-393,51
C(s) (diamante)	12,011	+1,895	+2,900	2,377	6,113	-395,40
CO ₂ (g)	44,010	-393,51	-394,36	213,74	37,11	
Hidrocarburos						
CH ₄ (g), metano	16,04	-74,81	-50,72	186,26	35,31	-890
CH ₃ (g), metilo	15,04	+145,69	+147,92	194,2	38,70	
C ₂ H ₂ (g), etino	26,04	+226,73	+209,20	200,94	43,93	-1300
C ₂ H ₄ (g), eteno	28,05	+52,26	+68,15	219,56	43,56	-1411
C ₂ H ₆ (g), etano	30,07	-84,68	-32,82	229,60	52,63	-1560
C ₃ H ₆ (g), propeno	42,08	+20,42	+62,78	267,05	63,89	-2058
C ₃ H ₆ (g), ciclopropano	42,08	+53,30	+104,45	237,55	55,94	-2091
C ₃ H ₈ (g), propano	44,10	-103,85	-23,49	269,91	73,5	-2220
C ₄ H ₈ (g), 1-buteno	56,11	-0,13	+71,39	305,71	85,65	-2717
C ₄ H ₈ (g), <i>cis</i> -2-buteno	56,11	-6,99	+65,95	300,94	78,91	-2710



C ₄ H ₈ (g), <i>trans</i> -2-buteno	56,11	-11,17	+63,06	296,59	87,82	
C ₄ H ₁₀ (g), butano	58,13	-126,15	-17,03	310,23	97,45	
C ₅ H ₁₂ (g), pentano	72,15	-146,44	-8,20	348,40	120,2	
C ₅ H ₁₂ (l)	72,15	-173,1				
C ₆ H ₆ (l), benceno	78,12	+49,0	+124,3	173,3	136,1	
C ₆ H ₆ (g)	78,12	+82,93	+129,72	269,31	81,67	
C ₆ H ₁₂ (l), ciclohexano	84,16	-156	+26,8		156,5	
C ₆ H ₁₄ (l), hexano	86,18	-198,7		204,3		
C ₆ H ₅ CH ₃ (g), tolueno	92,14	+50,0	+122,0	320,7	103,6	
C ₇ H ₁₆ (l), heptano	100,21	-224,4	+1,0	328,6	224,3	
C ₈ H ₁₈ (l), octano	114,23	-249,9	+6,4	361,1		
C ₈ H ₁₈ (l), <i>iso</i> -octano	114,23	-255,1				
C ₁₀ H ₈ (s), naftaleno	128,18	+78,53				
Alcoholes y fenoles						
CH ₃ OH(l), metanol	32,04	-238,66	-166,27	126,8	81,6	
CH ₃ OH(g)	32,04	-200,66	-161,96	239,81	43,89	
C ₂ H ₅ OH(l), etanol	46,07	-277,69	-174,78	160,7	111,46	
C ₂ H ₅ OH(g)	46,07	-235,10	-168,49	282,70	65,44	
C ₆ H ₅ OH(s), fenol	94,12	-165,0	-50,9	146,0		
Ácidos carboxílicos, hidroxí-ácidos, y ésteres						
HCOOH(l), fórmico	46,03	-424,72	-361,35	128,95	99,04	
CH ₃ COOH(l), acético	60,05	-484,5	-389,9	159,8	124,3	
CH ₃ COOH(aq)	60,05	-485,76	-396,46	178,7		
(COOH) ₂ (s), oxálico	90,04	-827,2			117	
C ₆ H ₅ COOH(s), benzoico	122,13	-385,1	-245,3	167,6	146,8	
CH ₃ CH(OH)COOH(s), láctico	90,08	-694,0				
CH ₃ COOC ₂ H ₅ (l), acetato de etilo	88,11	-479,0	-332,7	259,4	170,1	
Aldehidos y cetonas						
HCHO(g), metanal	30,03	-108,57	-102,53	218,77	35,40	
CH ₃ CHO(l), etanal	44,05	-192,30	-128,12	160,2		
CH ₃ CHO(g)	44,05	-166,19	-128,86	250,3	57,3	
CH ₃ COCH ₃ (l), propanona	58,08	-248,1	-155,4	200,4	124,7	
Azúcares						
C ₆ H ₁₂ O ₆ (s), α-D-glucosa	180,16	-1274				
C ₆ H ₁₂ O ₆ (s), β-D-glucosa	180,16	-1268	-910	212		
C ₆ H ₁₂ O ₆ (s), β-D-fructuosa	180,16	-1266				
C ₁₂ H ₂₂ O ₁₁ (s), sucrosa	342,30	-2222	-1543	360,2		
Compuestos nitrogenados						
CO(NH ₂) ₂ (s), urea	60,06	-333,51	-197,33	104,60	93,14	
CH ₃ NH ₂ (g), metil-amina	31,06	-22,97	+32,16	243,41	53,1	
C ₆ H ₅ NH ₂ (l), anilina	93,13	+31,1				
CH ₂ (NH ₂)COOH(s), glicina	75,07	-532,9	-373,4	103,5	99,2	



Azufre

S(s, α) (rómboico)	32,06	0	0	31,80	22,64
S(s, β) (monoclínico)	32,06	+0,33	+0,1	32,6	23,6
SO ₂ (g)	64,06	-296,83	-300,19	248,22	39,87
SO ₃ (g)	80,06	-395,72	-371,06	256,76	50,67
H ₂ SO ₄ (l)	98,08	-813,99	-690,00	156,90	138,9
H ₂ S(g)	34,08	-20,63	-33,56	205,79	34,23
SF ₆ (g)	146,05	-1209	-1105,3	291,82	97,28

Bromo

Br ₂ (l)	159,82	0	0	152,23	75,689
Br ₂ (g)	159,82	+30,907	+3,110	245,46	36,02
HBr(g)	90,92	-36,40	-53,45	198,70	29,142

Calcio

Ca(s)	40,08	0	0	41,42	25,31
CaO(s)	56,08	-635,09	-604,03	39,75	42,80
CaCO ₃ (s) (calcita)	100,09	-1206,9	-1128,8	92,9	81,88
CaCO ₃ (s) (aragonita)	100,09	-1207,1	-1127,8	88,7	81,25
CaF ₂ (s)	78,08	-1219,6	-1167,3	68,87	67,03
CaCl ₂ (s)	110,99	-795,8	-748,1	104,6	72,59
CaBr ₂ (s)	199,90	-682,8	-663,6	130	

Carbono

CO(g)	28,011	-110,53	-137,17	197,67	29,14
CO ₂ (g)	44,010	-393,51	-394,36	213,74	37,11
CCl ₄ (l)	153,82	-135,44	-65,21	216,40	131,75
CS ₂ (l)	76,14	+89,70	+65,27	151,34	75,7
HCN(g)	27,03	+135,1	+124,7	201,78	35,86
HCN(l)	27,03	+108,87	+124,97	112,84	70,63

Cloro

Cl ₂ (g)	70,91	0	0	223,07	33,91
Cl(g)	35,45	121,7			
HCl(g)	36,46	-92,31	-95,30	186,91	29,12

Flúor

F ₂ (g)	38,00	0	0	202,78	31,30
HF(g)	20,01	-271,1	-273,2	173,78	29,13

Fósforo

P(s,blanco)	30,97	0	0	41,09	23,840
PH ₃ (g)	34,00	+5,4	+13,4	210,23	37,11
PCl ₃ (g)	137,33	-287,0	-267,8	311,78	71,84
PCl ₃ (l)	137,33	-319,7	-272,3	217,1	
PCl ₅ (g)	208,24	-374,9	-305,0	364,6	112,8
PCl ₅ (s)	208,24	-443,5			
H ₃ PO ₃ (s)	82,00	-964,4			
H ₃ PO ₄ (s)	94,97	-1279,0	-1119,1	110,50	106,06
H ₃ PO ₄ (l)	94,97	-1266,9			
P ₄ O ₁₀ (s)	283,89	-2984,0	-2697,0	228,86	211,71



P₄O₆(s) 219,89 -1640,1

Hidrógeno

H ₂ (g)	2,016	0	0	130,684	28,824
H ₂ O(l)	18,015	-285,83	-237,13	69,91	75,291
H ₂ O(g)	18,015	-241,82	-228,57	188,83	33,58
H ₂ O ₂ (l)	34,015	-187,78	-120,35	109,6	89,1

Iodo

I ₂ (s)	253,81	0	0	116,135	54,44
I ₂ (g)	253,81	+62,44	+19,33	260,69	36,90
HI(g)	127,91	+26,48	+1,70	206,59	29,158

Nitrógeno

N ₂ (g)	28,013	0	0	191,61	29,125
NO(g)	30,01	+90,25	+86,55	210,76	29,844
N ₂ O(g)	44,01	+82,05	+104,20	219,85	38,45
NO ₂ (g)	46,01	+33,18	+51,31	240,06	37,20
N ₂ O ₄ (g)	92,01	+9,16	+97,89	304,29	77,28
N ₂ O ₅ (s)	108,01	-43,1	+113,9	178,2	143,1
N ₂ O ₅ (g)	108,01	+11,3	+115,1	355,7	84,5
HNO ₃ (l)	63,01	-174,10	-80,71	155,60	109,87
NH ₃ (g)	17,03	-46,11	-16,45	192,45	35,06
NH ₂ OH(s)	33,03	-114,2			
N ₂ H ₄ (l)	32,05	+50,63	+149,43	121,21	139,3
NH ₄ NO ₃ (s)	80,04	-365,56	-183,87	151,08	84,1
NH ₄ Cl(s)	53,49	-314,43	-202,87	94,6	

Oxígeno

O ₂ (g)	31,999	0	0	205,138	29,355
O ₃ (g)	47,998	+142,7	+163,2	238,93	39,20

Potasio

K(s)	39,10	0	0	64,18	29,58
KOH(s)	56,11	-424,76	-379,08	78,9	64,9
KF(s)	58,10	-576,27	-537,75	66,57	49,04
KCl(s)	74,56	-436,75	-409,14	82,59	51,30
KBr(s)	119,01	-393,80	-380,66	95,90	52,30
KI(s)	166,01	-327,90	-324,89	106,32	52,93

Sodio

Na(s)	22,99	0	0	51,21	28,24
Na(g)	22,99	107,000			
NaOH(s)	40,00	-425,61	-379,49	64,46	59,54
NaCl(s)	58,44	-410,90	-384,14	72,13	50,50
NaBr(s)	102,90	-361,06	-348,98	86,82	51,38
NaI(s)	149,89	-287,78	-286,06	98,53	52,09

Potenciales estándar de reducción a 25 °C

SEMIRREACCIÓN	E°(V)
$\text{Li}^+(ac) + e^- \longrightarrow \text{Li}(s)$	-3.05
$\text{K}^+(ac) + e^- \longrightarrow \text{K}(s)$	-2.93
$\text{Ba}^{2+}(ac) + 2e^- \longrightarrow \text{Ba}(s)$	-2.90
$\text{Sr}^{2+}(ac) + 2e^- \longrightarrow \text{Sr}(s)$	-2.89
$\text{Ca}^{2+}(ac) + 2e^- \longrightarrow \text{Ca}(s)$	-2.87
$\text{Na}^+(ac) + e^- \longrightarrow \text{Na}(s)$	-2.71
$\text{Mg}^{2+}(ac) + 2e^- \longrightarrow \text{Mg}(s)$	-2.37
$\text{Be}^{2+}(ac) + 2e^- \longrightarrow \text{Be}(s)$	-1.85
$\text{Al}^{3+}(ac) + 3e^- \longrightarrow \text{Al}(s)$	-1.66
$\text{Mn}^{2+}(ac) + 2e^- \longrightarrow \text{Mn}(s)$	-1.18
$2\text{H}_2\text{O} + 2e^- \longrightarrow \text{H}_2(g) + 2\text{OH}^-(ac)$	-0.83
$\text{Zn}^{2+}(ac) + 2e^- \longrightarrow \text{Zn}(s)$	-0.76
$\text{Cr}^{3+}(ac) + 3e^- \longrightarrow \text{Cr}(s)$	-0.74
$\text{Fe}^{2+}(ac) + 2e^- \longrightarrow \text{Fe}(s)$	-0.44
$\text{Cd}^{2+}(ac) + 2e^- \longrightarrow \text{Cd}(s)$	-0.40
$\text{PbSO}_4(s) + 2e^- \longrightarrow \text{Pb}(s) + \text{SO}_4^{2-}(ac)$	-0.31
$\text{Co}^{2+}(ac) + 2e^- \longrightarrow \text{Co}(s)$	-0.28
$\text{Ni}^{2+}(ac) + 2e^- \longrightarrow \text{Ni}(s)$	-0.25
$\text{Sn}^{2+}(ac) + 2e^- \longrightarrow \text{Sn}(s)$	-0.14
$\text{Pb}^{2+}(ac) + 2e^- \longrightarrow \text{Pb}(s)$	-0.13
$2\text{H}^+(ac) + 2e^- \longrightarrow \text{H}_2(g)$	0.00
$\text{Sn}^{4+}(ac) + 2e^- \longrightarrow \text{Sn}^{2+}(ac)$	+0.13
$\text{Cu}^{2+}(ac) + e^- \longrightarrow \text{Cu}^+(ac)$	+0.15
$\text{SO}_4^{2-}(ac) + 4\text{H}^+(ac) + 2e^- \longrightarrow \text{SO}_2(g) + 2\text{H}_2\text{O}$	+0.20
$\text{AgCl}(s) + e^- \longrightarrow \text{Ag}(s) + \text{Cl}^-(ac)$	+0.22
$\text{Cu}^+(ac) + e^- \longrightarrow \text{Cu}(s)$	+0.34
$\text{O}_2(g) + 2\text{H}_2\text{O} + 4e^- \longrightarrow 4\text{OH}^-(ac)$	+0.40
$\text{I}_2(s) + 2e^- \longrightarrow 2\text{I}^-(ac)$	+0.53
$\text{MnO}_2(ac) + 2\text{H}_2\text{O} + 3e^- \longrightarrow \text{MnO}_2(s) + 4\text{OH}^-(ac)$	+0.59
$\text{O}_2(g) + 2\text{H}^+(ac) + 2e^- \longrightarrow \text{H}_2\text{O}_2(ac)$	+0.68
$\text{Fe}^{3+}(ac) + e^- \longrightarrow \text{Fe}^{2+}(ac)$	+0.77
$\text{Ag}^+(ac) + e^- \longrightarrow \text{Ag}(s)$	+0.80
$\text{Hg}_2^{2+}(ac) + 2e^- \longrightarrow 2\text{Hg}(l)$	+0.85
$2\text{Hg}^{2+}(ac) + 2e^- \longrightarrow \text{Hg}_2^{2+}(ac)$	+0.92
$\text{NO}_3^-(ac) + 4\text{H}^+(ac) + 3e^- \longrightarrow \text{NO}(g) + 2\text{H}_2\text{O}$	+0.96
$\text{Br}_2(l) + 2e^- \longrightarrow 2\text{Br}^-(ac)$	+1.07
$\text{O}_2(g) + 4\text{H}^+(ac) + 4e^- \longrightarrow 2\text{H}_2\text{O}$	+1.23
$\text{MnO}_2(s) + 4\text{H}^+(ac) + 2e^- \longrightarrow \text{Mn}^{2+}(ac) + 2\text{H}_2\text{O}$	+1.23
$\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}(ac) + 14\text{H}^+(ac) + 6e^- \longrightarrow 2\text{Cr}^{3+}(ac) + 7\text{H}_2\text{O}$	+1.33
$\text{Cl}_2(g) + 2e^- \longrightarrow 2\text{Cl}^-(ac)$	+1.36
$\text{Au}^3+(ac) + 3e^- \longrightarrow \text{Au}(s)$	+1.50
$\text{MnO}_2(ac) + 8\text{H}^+(ac) + 5e^- \longrightarrow \text{Mn}^{2+}(ac) + 4\text{H}_2\text{O}$	+1.51
$\text{Ce}^{4+}(ac) + e^- \longrightarrow \text{Ce}^{3+}(ac)$	+1.61
$\text{PbO}_2(s) + 4\text{H}^+(ac) + \text{SO}_4^{2-}(ac) + 2e^- \longrightarrow \text{PbSO}_4(s) + 2\text{H}_2\text{O}$	+1.70
$\text{H}_2\text{O}_2(ac) + 2\text{H}^+(ac) + 2e^- \longrightarrow 2\text{H}_2\text{O}$	+1.77
$\text{Co}^{3+}(ac) + e^- \longrightarrow \text{Co}^{2+}(ac)$	+1.82
$\text{O}_3(g) + 2\text{H}^+(ac) + 2e^- \longrightarrow \text{O}_2(g) + \text{H}_2\text{O}(l)$	+2.07
$\text{F}_2(g) + 2e^- \longrightarrow 2\text{F}^-(ac)$	+2.87

Fuerza oxidante creciente

Fuerza reductora creciente

Valores de afinidad electrónica $\frac{KJ}{mol}$

1A (1)	2A (2)	3A (13)	4A (14)	5A (15)	6A (16)	7A (17)	8A (18)
H -72.8		B -26.7	C -122	N +7	O -141	F -328	He (0.0)
Li -59.6	Be ≤0	Al -42.5	Si -134	P -72.0	S -200	Cl -349	Ne (+29)
Na -52.9	Mg ≤0	Ga -28.9	Ge -119	As -78.2	Se -195	Br -325	Ar (+35)
K -48.4	Ca -2.37	In -28.9	Sn -107	Sb -103	Te -190	I -295	Kr (+39)
Rb -46.9	Sr -5.03	Tl -19.3	Pb -35.1	Bi -91.3	Po -183	At -270	Xe (+41)
Cs -45.5	Ba -13.95						Rn (+41)

Valores de energía de ionización $\frac{KJ}{mol}$






Tabla periódica de los elementos según estados de oxidación

H -1,1																	He
Li 1	Be 2											B 3	C 2,4	N -3,1,2,3,4	O -2,-1	F -1	Ne
Na 1	Mg 2											Al 3	Si 4	P -3,3,4,5	S -2,2,4,6	Cl -1,1,3,5	Ar
K 1	Ca 2	Sc 3	Ti 4	V 2,3,4,5	Cr 2,3,6	Mn 2,3,4,6,7	Fe 2,3	Co 2,3	Ni 2,3	Cu 1,2,3,4	Zn 2	Ga 3	Ge 2,4	As -3,3,5	Se -2,2,4,6	Br -1,1,3,5	Kr
Rb 1	Sr 2	Y 3	Zr 4	Nb 2,3,4,5	Mo 2,3,4,5,6	Tc 4,7	Ru 2,3,4,6,8	Rh 3	Pd 1,2,4,6	Ag 1,2,3,4	Cd 1,2	In 3	Sn 2,4	Sb -3,3,5	Te -2,2,4,6	I -1,1,3,5	Xe
Cs 1	Ba 2	La 3	Hf 2,3,4	Ta 5	W 4,6	Re 4	Os 4	Ir 3,4	Pt 2,4	Au 1,3	Hg 1,2	Tl 1,3	Pb 2,4	Bi -3,3,5	Po -2,2,4	At -1,1	Rn
Fr 1	Ra 2	Ac 3	Rf 4	Db 5	Sg 6	Bh 7	Hs 8	Mt	Ds	Rg	Cn	Uut	Fl	Uup	Lv	Uus	Uuo

Ce 3,4	Pr 3	Nd 3	Pm 3	Sm 3	Eu 2,3	Gd 3	Tb 3	Dy 3	Ho 3	Er 3	Tm 3	Yb 3	Lu 3
Th 4	Pa 5	U 6	Np 5	Pu 4	Am 3	Cm 3	Bk 3	Cf 3	Es 3	Fm 3	Md 3	No 2	Lr 3

Tabla periódica de los elementos

1 1.00797 H HIDROGENO 1																	2 4.0026 He HELIO 2
3 6.941 Li LITIO 3	4 9.0122 Be BERILIO 4											5 10.811 B BORO 5	6 12.011 C CARBONO 6	7 14.003 N NITROGENO 7	8 15.999 O OXIGENO 8	9 18.998 F FLUOR 9	10 20.183 Ne NEON 10
11 22.989 Na SODIO 11	12 24.305 Mg MAGNESIO 12											13 26.981 Al ALUMINIO 13	14 28.086 Si SILICIO 14	15 30.974 P FOSFORO 15	16 32.06 S AZUFRE 16	17 35.453 Cl CLORO 17	18 39.948 Ar ARGON 18
19 39.098 K POTASIO 19	20 40.078 Ca CALCIO 20	21 44.956 Sc ESCANDIO 21	22 47.88 Ti TITANIO 22	23 50.942 V VANADIO 23	24 51.996 Cr CROMO 24	25 54.938 Mn MANGANESO 25	26 55.845 Fe HIERRO 26	27 58.933 Co COBALTO 27	28 58.933 Ni NIOBELIO 28	29 63.546 Cu COBRE 29	30 65.38 Zn ZINC 30	31 69.723 Ga GALIO 31	32 72.64 Ge GERMANIO 32	33 74.922 As ARSENICO 33	34 78.971 Se SELENO 34	35 79.904 Br BROMO 35	36 83.80 Kr KRIPTON 36
37 85.468 Rb RUBIDIO 37	38 87.62 Sr ESTRONCIO 38	39 88.906 Y ITRIO 39	40 91.224 Zr ZIRCONIO 40	41 92.906 Nb NIOBIO 41	42 95.94 Mo MOLIBDENO 42	43 101.07 Tc TECNICIO 43	44 101.07 Ru RUTENIO 44	45 102.905 Rh RODIO 45	46 106.42 Pd PALADIO 46	47 107.868 Ag PLATA 47	48 112.411 Cd CADMIO 48	49 114.818 In INDIO 49	50 118.710 Sn ESTANCO 50	51 121.757 Sb ANTIMONIO 51	52 127.603 Te TELURIO 52	53 126.905 I YODO 53	54 131.29 Xe XENON 54
55 132.905 Cs CESIO 55	56 137.327 Ba BARIO 56	57 138.905 La LANTANIO 57	72 178.48 Hf HAFNIO 72	73 180.948 Ta TANTALIO 73	74 183.84 W WOLFRAMIO 74	75 186.207 Re RENEO 75	76 186.207 Os OSMIO 76	77 193.224 Ir IRIDIO 77	78 195.084 Pt PLATINO 78	79 196.967 Au ORO 79	80 200.59 Hg MERCURIO 80	81 204.38 Tl TALIO 81	82 207.19 Pb PLOMO 82	83 208.98 Bi BISMUTO 83	84 210.987 Po POLONIO 84	85 210.987 At ASTATO 85	86 222 Rn RADON 86
87 223.019 Fr FRANCIO 87	88 226.025 Ra RADIO 88	89 227.033 Ac ACTINIO 89	104 261.101 Ku KURCATOVIO 104	105 262.108 Ha HANIO 105													
LANTANIDOS		58 140.12 Ce CERIO 58	59 140.907 Pr PRASEODIMIO 59	60 144.24 Nd NEODIMIO 60	61 147.07 Pm PROMETIO 61	62 150.36 Sm SAMARIO 62	63 151.96 Eu EUROPIO 63	64 157.25 Gd GADOLINIO 64	65 158.925 Tb TERBIO 65	66 162.50 Dy DISPROSIO 66	67 164.93 Ho HOLMIO 67	68 167.259 Er ERBIO 68	69 168.934 Tm TERMIO 69	70 173.054 Yb YTERBIO 70	71 174.973 Lu LUTECIO 71	ACTINIDOS	
		90 232.0377 Th TORIO 90	91 231.03688 Pa PROTACTINIO 91	92 238.02891 U URANIO 92	93 237.04817 Np NEPTUNIO 93	94 244.06422 Pu PLUTONIO 94	95 244.06422 Am AMERICIO 95	96 247.07125 Cm CURCIO 96	97 247.07125 Bk BERKELIO 97	98 251.07642 Cf CALIFORNIO 98	99 252.08322 Es EINSTEINIO 99	100 252.08322 Fm FERMIO 100	101 257.10375 Md MENDELIVIO 101	102 257.10375 No NOBELIO 102	103 257.10375 Lr LAWRENCIO 103		